



DICAS PARA EMPEENDER NO SETOR DE PRODUÇÃO DE MARACUJA

CLIMA E SOLO

- Temperatura Ideal: 20°C a 32°C (evite extremos para maximizar crescimento).
- Precipitação Anual: 1.200-1.800 mm (garanta drenagem para prevenir encharcamento).
- Características do Solo: Bem drenado, com pH entre 5,5 e 6,5 (ideal para absorção de nutrientes).
- Ação Inicial: Realize análise de solo e aplique calcário corretivo se o pH estiver abaixo de 5,5 – consulte um agrônomo para dosagem precisa.

PREPARO DA ÁREA

- Limpeza e Preparo do Solo: Remova ervas daninhas e ara o terreno para aeração (profundidade de 30-40 cm).
- Espaçamento Recomendado: 3,0 m entre linhas x 2,0 m entre plantas (otimiza ventilação e colheita mecanizada).
- Composição por Cova: 10-15 L de esterco curtido + 200-300 g de NPK 10-30-10 (fórmula rica em fósforo para enraizamento inicial).

MANEJO INICIAL

- Irrigação Inicial: Diária nos primeiros 30 dias, com 2-4 L por planta
- (promove estabelecimento radicular rápido).
- Controle de Plantas Competitivas: Capina manual ou cobertura morta orgânica a cada 15-20 dias (reduz competição por água e nutrientes).
- Suporte às Plantas: Instale tutoramento (varas de 2 m) e amarre ramos principais na 4ª semana (previne quebra e facilita colheita).
- Nutrição e Proteção: Adubação foliar mensal + controle biológico de pragas (use inimigos naturais para sustentabilidade).



PRAGAS E DOENÇAS

- Pragas: mosca-das-frutas ácaros, lagartas, broca-do-fruto
- Doenças: bacteriose, antracnose fusarios

PRODUTIVIDADE

- 20 a 30 t/ha/ano
- Início da colheita: 6 a 8 meses
- Vida útil do pomar: 18 a 24 meses

